



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دانشکده پزشکی

پایان نامه برای اخذ درجه دکترای پزشکی عمومی

عنوان :

بررسی ارتباط رینوسینوزیت مزمن و اختلال افسردگی ماژور در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه حمزه فسا در سال ۹۵_۹۶

استاد راهنما :

دکتر سیاوش معتضدیان

استاد مشاور :

دکتر سمیه معتضدیان

دکتر عزیزاله دهقان

نگارش :

وحید بازوجو

چکیده:

بررسی ارتباط رینوسینوزیت مزمن و اختلال افسردگی مازور در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه حمزه فسا در سال ۹۵_۹۶

مقدمه: رینوسینوزیت مزمن یکی از شایعترین بیماری های مزمن است. اختلالات روانپزشکی از قبیل اضطراب و افسردگی به عنوان عوامل افزایش دهنده علائم بیماری و اختلال عملکرد در تعدادی از بیماری های مزمن اثبات شده است. همچنین مطالعه های گذشته نشان داده است بیماری های مزمن و موربیدیتهای همراه آن میتواند باعث افسردگی شود و ممکن است رینوسینوزیت مزمن باعث اختلال افسردگی اساسی شود.

روش بررسی: این طرح پژوهشی یک مطالعه ی مقطعی-تحلیلی می باشد که در آن ۹۱ بیمار مبتلا به رینوسینوزیت مزمن به عنوان مورد و ۱۱۰ نفر به عنوان کنترل گرفته شد که پرسشنامه افسردگی همیلتون برایشان پر شد.

نتایج: در مطالعه ای که انجام شد نشان داد شیوع اختلال افسردگی اساسی در گروه مبتلا به رینوسینوزیت مزمن نسبت به گروه کنترل بصورت معنی داری بالاتر بود.

بحث و نتیجه گیری: بالاتر بودن شیوع اختلال افسردگی اساسی در بیماران رینوسینوزیت مطالعه پیشنهاد کننده ی نقش رینوسینوزیت مزمن در ایجاد اختلال افسردگی اساسی است.

واژگان کلیدی: رینوسینوزیت مزمن، اختلال افسردگی اساسی، اختلالات روانپزشکی

Abstract

The relationship between chronic rhinosinusitis and major depressive disorder in patients referred to hamze corruption in 2017

Introduction : Chronic rhinosinusitis is one of the most common chronic diseases. Psychiatric disorders such as anxiety and depression have been proven to be a factor in increasing the symptoms of the disease and disorder in some of the chronic diseases. Previous studies have also shown that chronic illness and associated morbidity can lead to depression and chronic rhinosinusitis may cause as a depressive disorder.

Material and methods : This research project is a cross-sectional study in which 91 patients with chronic rhinosinusitis as a case and 110 subjects were taken as a control and completed Hamilton questionnaire.

Results : In the study, the prevalence of major depressive disorder was significantly higher in the group with chronic rhinosinusitis than in the control group

Conclusion : A higher prevalence of major depressive disorder in patients with rhinosinusitis. The study suggests the role of chronic rhinosinusitis in inducing major depressive disorder.

Key words : Chronic rhinosinusitis, major depressive disorder, psychiatric disorders