



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشکده پزشکی

پایان نامه برای اخذ درجه دکترای پزشکی عمومی

عنوان :

مقایسه اختلال PTSD در بیماران بهبود یافته از کرونا به صورت سرپایی و بستری شده در ICU بیمارستان حضرت ولی عصر فسا سال 1400

استاد راهنما :

دکتر امیررضا خدامان

استاد مشاور:

دکتر عزیزالله دهقان

نگارش :

حدیث آب سالان

شماره پایان نامه: 9465

مرداد 1401

چکیده:

مقدمه: مطالعات مختلف نشان دادند که بیمارانی که در بخش ICU پذیرش می شوند ممکن است برخی اختلالات روانشناختی ناشی برخورد با مداخلات تهاجمی، استفاده از تجهیزات مانند ونتیلاتور، دیالیز و دفیبریلاتور، را تجربه کنند. ما مطالعه ای را در نظر گرفته ایم که در ابتدا شیوع اختلال PTSD در بیماران بهبود یافته از کرونا به صورت سرپایی و بستری شده در ICU را مورد سنجش و مقایسه قرار دهیم.

روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی مقطعی بود. جامعه آماری این مطالعه، شامل 100 نفر از بیمارانی بود که پس از ابتلا به بیماری کووید - 19 و بستری در بخش ICU بیمارستان ولی عصر فسا، بهبود یافته باشند و از بخش ترخیص شده باشند. همچنین گروه دوم مورد مطالعه در این پژوهش، شامل 100 نفر از بیمارانی بود که به علت ابتلا به بیماری کووید - 19 به بیمارستان ولی عصر فسا مراجعه کرده باشند و به صورت سرپایی ترخیص شده و بهبود یافته باشند. گروه سوم مورد بررسی نیز شامل 100 نفر از بیمارانی در نظر گرفته شد که در بخش های بیمارستان به دلایلی غیر از ابتلا به کووید-19 بستری باشند. سپس پژوهشگر، با تماس تلفنی با هریک از بیماران و با معرفی خود و اهداف مطالعه، وضعیت بهبودی آن ها را بررسی نمود و افرادی که از ابتلا به کووید - 19 بهبود نیافته باشند، از مطالعه خارج شدند. از آزمونهای کای اسکوایر، تی مستقل و رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

نتایج: در مجموع 300 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی شرکت کنندگان 48/35 19/96 سال بود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که نمره به دست آمده از اختلال پس از سانحه با سن و طول مدت بستری در بیمارستان ارتباط معنی داری دارد ($P\text{-Value} > 0.001$). اما وضعیت ازدواج، به عنوان یک عامل مؤثر در نمره PTSD اعلام شد و اختلال پس از سانحه در گروه مجرد، به طور معنی داری بیشتر بود ($P\text{-Value} = 0.008$). همچنین نشان داده شد یکی از عوامل تأثیرگذار در نمره اختلال پس از سانحه، سطح تحصیلات شرکت کنندگان بود. به طوری که بیشتری نمره کسب شده مربوط به گروه دانشجو و فوق لیسانس بود.

بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که نمره به دست آمده از اختلال پس از سانحه با سن و طول مدت بستری در بیمارستان ارتباط معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اختلال پس از سانحه با وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و وضعیت بستری شرکت کنندگان ارتباط معنی داری داشت.

واژگان کلیدی: بخش مراقبت های ویژه، اختلال پس از سانحه، کووید-19

Abstract

Introduction: Various studies have shown that patients admitted to the ICU may experience some psychological disorders caused by aggressive interventions, the use of equipment such as ventilators, dialysis and defibrillators. We have considered a study to first compare and compare the prevalence of PTSD disorder in improved Corona patients on an outpatient and hospitalized ICU.

Material and methods: The present study was an cross-sectional type. The statistical population of this study consisted of 100 patients who were improved and discharged from the ICU ward of Vali Asr Fasa Hospital after being in the ICU ward of Vali Asr Fasa Hospital. The second group in this study also included 100 patients who had been referred to Vali Asr Fasa Hospital due to the Covid-19 and had been discharged and improved. The third group also included 100 patients who were hospitalized for reasons other than Covid-19. The researcher then examined their recovery status by phone by phone with each of the patients and by introducing themselves and the goals of the study, and those who did not recover from Covid-19 were out of study. The Kai Square, independent T and Logast regression tests were used to analyze the data.

Results: A total of 300 people were examined. The average age of the participants was 96/19 35.35 years. The findings from the study showed that the score obtained from the disorder was significantly related to the age and duration of hospital (P-Value <0.001). But the marriage status was declared as an effective factor in the PTSD score, and post-traumatic disorder in the single group was significantly higher (P-value = 0.008). It was also shown that one of the factors affecting the post -traumatic disorder score was the level of education of the participants. So most of the score was for the student and postgraduate group.

Conclusion: The findings from the study showed that the score obtained from the disorder was significantly related to the age and duration of hospitalization. The results also showed that post -traumatic disorder was significantly related to the marital status, education level and hospitalization.

Key words: Covid-19, PTSD, ICU